

bibliographie

1. Adam P. « Baromètre gay 2000. Résultats d'un premier sondage auprès des clients des établissements gays parisiens ». *BEH* 2002 ; 18 : 77-79.
2. Adam P., Hauet E., Caron C. *Recrudescence des prises de risque et des MST parmi les gays. Résultats préliminaires de l'enquête Presse Gay 2000. Rapport mai 2001*. Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France.
3. Bentz L., Pradier C., Tourette-Turgis C., et al. « Description et évaluation d'un programme d'intervention sur l'observance thérapeutique (counseling) dans un centre hospitalo-universitaire ». In : *L'observance aux traitements contre le VIH/sida*. Paris : ANRS ; collection Sciences sociales et sida, 2001 : 99-112.
4. Bouhnik A. D., Moatti J.-P., Vlahov D. et al. « Highly active antiretroviral treatment does not increase sexual risk behaviour among French HIV infected injecting drug users ». *J Epidemiol Community Health* 2002 ; 56 : 349-353
5. Buchacz K., van der Straten A., Saul J., Shiboski S. C., Gomez C. A., Padian N. (2001). « Sociodemographic, behavioral, and clinical correlates of inconsistent condom use in HIV-serodiscordant heterosexual couples ». *J Acquir Immune Defic Syndr*, 28 [3] : 289-297.
6. Carr A., Samaras K., Burton S., et al. « A syndrome of peripheral lipodystrophy, hyperlipidaemia and insulin resistance in patients receiving HIV protease inhibitors ». *AIDS* 1998, 12 : F51-58.
7. Carrieri P., Cailleton V., Le Moing V., et al. « The dynamic of adherence to highly active antiretroviral therapy : results from the french national Aproco cohort ». *J Acquir Immune Defic Syndr* 2001, 28 : 232-239.
8. Catchpole M. « Sexually transmitted diseases in England and Wales ». *CDR review* 1992 ; 2 : 1-7.
9. Centers for Disease Control and Prevention. « Trends in gonorrhea in homosexual active men – King County, Washington ». *MMWR* 1989 ; 38 : 762-764.
10. Chesney M. A. « Factors affecting adherence to antiretroviral therapy ». *Clin Infect Dis* 2000, 30 : S171-S176.
11. Chirac P. « Increasing the Access to Antiretroviral Drugs to Moderate the Impact of AIDS : an Exploration of Alternative Options ». www.unicef-icdc.org/research/ESP/aids/chapter14.pdf.
12. Clumeck N., Goebel F., Rozenbaum W., et al. « Simplification with abacavir-based triple nucleoside therapy versus continued protease inhibitor-based highly active antiretroviral therapy in HIV-1-infected patients with undetectable plasma HIV-1 RNA ». *AIDS* 2001, 15 : 1517-1526.
13. Collins C., Morin S. F., Shriver M. D., Coates T. J., in collaboration with participants at the policy forum Primary HIV prevention. « Designing effective programs for people living with HIV (2000) ». *Policy Monograph series – mars 2000*.
14. Connor E. M., Sperling R. S., Gelber R., Kiselev P., Scott G., O'Sullivan M. J. et al. « Reduction of maternal-infant transmission of Human Immunodeficiency Virus type 1 with zidovudine treatment ». *N Engl J Med* 1994 ; 331 : 1173-80.
15. Coutoudis A., Pillay K., Kuhn L., Spooner E., Tsai W. Y., Coovadia H. M. for the South African Vitamin A study group, 2001. « Method of feeding and transmission of HIV-1 from mothers to children by 15 months of age : prospective cohort study from Durban, South Africa ». *AIDS* ; 15 : 379-87.
16. Couturier E., Dupin N., Janier M. et al. « Résurgence de la syphilis en France, 2000-2001 ». *BEH* 2001 ; 35-36 : 168-169.
17. Crepaz N., Marks G. « Toward an understanding of sexual risk behavior in people living with HIV : a review of social, psychological, and medical findings ». *AIDS*, 2002, 16 [2] : 135-149.
18. Dabis F., Msellati P., Méda N., Wellfens-Ekra C., You B., Manigart O. et al. « Six month efficacy, tolerance and acceptability of a short regimen of oral zidovudine in reducing vertical transmission of HIV in breast-fed children : A double-blind placebo controlled multicentre trial, ANRS 049a, Côte d'Ivoire and Burkina Faso ». *Lancet* ; 1999, 353 : 786-92.
19. Deeks S., Smith M., Holodniy M., Kahn J. « HIV-1 protease inhibitors. A review for clinicians ». *JAMA* 1997, 277 : 145-153.
20. Delfraissy J.-F. *Prise en charge des personnes infectées par le VIH. Rapport 2002. Recommandations du groupe d'experts*. Paris : Flammarion, 2002.
21. Desenclos J. C. « Le retour de la syphilis en France : un signal de plus pour renforcer la prévention ». *BEH*, 2001, 35-36 : 1-2.
22. Dilley J. W., Woods W. J., McFarland W. « Are advances in treatment changing views about high-risk sex ? » *N Engl J Med* 1997 ; 337 : 501-502.
23. Duran S., Saves M., Spire B., et al. « Failure to maintain long-term adherence to highly active antiretroviral therapy : the role of lipodystrophy ». *AIDS* 2001, 15 : 2441-2444.
24. Duran S., Spire B., Raffi F., et al. « Self-reported symptoms after initiation of a protease inhibitor in HIV-infected patients and their impact on adherence to Haart ». *HIV Clin Trials* 2001, 2 : 38-45.
25. Erbleading E. J., Stanton D., Quinn T. C., Rompalo A. « Behavioral and biologic evidence of persistent high-risk behavior in an HIV primary care population ». *AIDS*, 2000, 14 [3] : 297-301.
26. European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. *HIV/AIDS Surveillance in Europe. End-year report 2000*. 2001 ; n° 64.
27. Goulet V., Sednaoui P., Massari V., Laurent E. « Confirmation de la recrudescence des gonococcies en France depuis 1998 ». *BEH* 2001 ; 14 : 168-169.
28. Grabar S., Pradier C., Le Corfec E., et al. « Factors associated with clinical and virological failure in patients receiving a triple therapy including a protease inhibitor ». *Aids* 2000, 14 : 141-149.
29. Guay L. A., Musoke P., Fleming T., Bagenda D., Allen M., Nakabito C. et al. « Intrapartum and neonatal single-dose nevirapine compared with zidovudine for prevention of mother to child transmission of HIV-1 in Kampala, Uganda : HIVNET 012 randomised trial ». *Lancet*, 1999, 354 : 795-802.
30. Kelly J. A., Hoffmann R. G., Rompa D., Gray M. « Protease inhibitor combination therapies and perceptions of gay men regarding AIDS severity and the need to maintain safer sex ». *AIDS* 1998 ; 12 : F91-F95.
31. Laporte A. « Un nouveau relâchement des comportements de prévention chez les homosexuels masculins : rôle des avancées thérapeutiques ? » *EuroSurveillance*, 2002, 7 [2] : 15-16. :
32. Leroy V., Karon J. M., Alioum A., Ekpini R. E., Meda N., Greenberg A. E. et al. « 24 months efficacy of maternal short course zidovudine regimen to prevent Mother-to-Child transmission of HIV-1 in West Africa ». *AIDS*, 2002, 16 : 631-41, 2002.
33. Leroy V., Newell M. L., Dabis F., Peckham C., Van de Perre P., Bulterys M. et al. « International multicentre pooled analysis of late postnatal mother to child transmission of HIV-1 infection ». *Lancet* ; 352 : 597-600, 1998.
34. Lert F. Drug use, AIDS and exclusion in



bibliographie

<p>France. In : <i>AIDS in Europe. New challenges for the social sciences</i>. Edited by Moatti J., Souteyrand Y., Prieur A., Sandfort T., Aggleton P. London : Routledge, Taylor & Francis Group, Collection « Social aspects of AIDS » ; 2000 : 189-203.</p> <p>35. Lurie P., Hintzen P., Lowe R. A. « Socio-economic obstacles to HIV prevention and treatment in developing countries : the roles of the International Monetary Fund and the World Bank ». <i>AIDS</i>, 1995, 9 : 539-46.</p> <p>36. Mansergh G., Marks G., Colfax G. N., Guzman R., Rader M., Buchbinder S. « "Barebacking" in a diverse sample of men who have sex with men ». <i>AIDS</i>, 2002, 16 : 653-659.</p> <p>37. Miller M., Meyer L., Boufassa F. et al. « Sexual behavior changes and protease inhibitor therapy ». <i>AIDS</i>, 2000 ; 14 : F33-F39.</p> <p>38. Moatti J. P., Carrieri M. P., Spire B., Gastaut J. A., Cassuto J. P., Moreau J. « Adherence to HAART in French HIV-infected injecting drug users : the contribution of buprenorphine drug maintenance treatment. The Manif 2000 study group ». <i>AIDS</i> 2000, 14 : 151-155.</p> <p>39. Morelle A. <i>La défaite de la santé publique</i>, Paris, Flammarion, 1996.</p> <p>40. Msellati P., Hingst G., Kaba F., Viho I., Wellfens Ekra C., Dabis F. « Operational issues in preventing mother-to-child transmission of HIV-1 in Abidjan, Cote d'Ivoire, 1998-99 ». <i>Bull WHO</i>, 2001, 79 : 641-7.</p> <p>41. MSF « From Durban to Barcelona : overcoming the treatment deficit » : www.accessmed-msf.org.</p> <p>42. Onusida. <i>Le point sur l'épidémie de sida, décembre 2001</i>. Genève, Suisse, Onusida, 2001. www.unaids.org/worldaidsday/2001/Epiupdate2001/Epiupdate2001_fr.pdf</p>	<p>43. Onusida. <i>Rapport sur l'épidémie mondiale de VIH/sida</i>, Genève, Suisse, Onusida, 2002. www.unaids.org/barcelona/presskit/french/barcelona_report/contents.html</p> <p>44. Orsif. <i>Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida en France, Évolutions 1992, 1994, 1998, 2001</i>. Rapport de l'ORS, décembre 2001.</p> <p>45. Orsif. <i>Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida en Île-de-France, Évolutions 1992, 1994, 1998, 2001</i>. Rapport de l'ORS, décembre 2001.</p> <p>46. Ostrow D. E., Fox K. J., Chmiel J. S. et al. « Attitudes towards highly active antiretroviral therapy are associated with sexual risk taking among HIV-infected and uninfected homosexual men ». <i>AIDS</i>, 2002 Mar 29 ; 16 [5] : 775-80.</p> <p>47. Paicheler G. <i>Prévention du sida et agenda politique : les campagnes en direction du grand public (1987-1996)</i>. Paris, CNRS-Éditions, 2002.</p> <p>48. Paterson D. L., Swindells S., Mohr J., et al. « Adherence to protease inhibitor therapy and outcomes in patients with HIV infection ». <i>Ann Intern Med</i> 2000, 133 : 21-30.</p> <p>49. Pierret J. « Everyday life with AIDS/HIV : surveys in the social sciences ». <i>Soc Sci Med</i> 2000, 50 : 1589-1598.</p> <p>50. Schrooten W., Colebunders R., Youle M., et al. « Sexual dysfunction associated with protease inhibitor containing highly active antiretroviral treatment ». <i>AIDS</i> 2001, 15 : 1019-1023.</p> <p>51. Spire B., Duran S., Souville M., Lepout C., Raffi F., Moatti J. P. « Adherence to highly active antiretroviral therapies (HAART) in HIV-infected patients : from a predictive to a dynamic approach ». <i>Soc Sci Med</i> 2002, 54 : 1481-1496.</p>	<p>52. Stolte I. G., Dukers N. H., de Wit J. B. F., Fennema H., Coutinho R. A. « Compte rendu de la situation à Amsterdam : augmentation des maladies sexuellement transmissibles et des comportements sexuels à risque chez les hommes homosexuels, liée à la mise sur le marché de nouveaux traitements anti-VIH ». <i>Eurosurveillance</i>, 2002 ; 7 [2] : 19-22</p> <p>53. Stone V. E., Hogan J. W., Schuman P., et al. « Antiretroviral regimen complexity, self-reported adherence, and HIV patients' understanding of their regimens : survey of women in the her study ». <i>J Acquir Immune Defic Syndr</i> 2001, 28 : 124-131.</p> <p>54. Tebas P., Powderly W. G., Claxton S., et al. « Accelerated bone mineral loss in HIV-infected patients receiving potent antiretroviral therapy ». <i>AIDS</i> 2000, 14 : F63-67.</p> <p>55. Tourette-Turgis C., Rébillon M. <i>Mettre en place des consultations d'observance aux traitements contre le VIH/sida. De la théorie à la pratique</i>. Paris : Comment Dire, 2002.</p> <p>56. Tuldra A., Fumaz C. R., Ferrer M. J., et al. « Prospective randomized two-Arm controlled study To determine the efficacy of a specific intervention To improve long-term adherence to highly active antiretroviral therapy ». <i>J Acquir Immune Defic Syndr</i> 2000, 25 : 221-228.</p> <p>57. Unids. <i>Report on the global HIV/AIDS epidemic</i>, Geneva, Unids, 2002.</p> <p>58. Van den Hoek J. A., Van Griensven G. J., Coutinho R. A. « Increase of unsafe homosexual behaviour ». <i>Lancet</i>, 1990 ; 336 : 179-180.</p> <p>59. Vidal L. <i>Femmes en temps de sida. Expériences d'Afrique</i>. Paris : PUF, coll. <i>Politique d'aujourd'hui</i>, 2000. </p>
---	--	---

adresses utiles

<p>Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS) 101, rue de Tolbiac 75013 Paris Téléphone : 01 53 94 60 00 Télécopie : 01 53 94 60 01</p> <p>Centre européen pour la surveillance épidémiologique du sida www.eurohiv.org</p> <p>Conseil national du sida 25/27, rue d'Astorg 75008 Paris Téléphone : 01 40 56 68 50 Télécopie : 01 40 56 68 90</p>	<p>Institut de veille sanitaire (InVS) 12, rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice Téléphone : 01 41 79 68 66 Télécopie : 01 41 79 67 17 www.invs.sante.fr</p> <p>Médecins sans frontières www.accessmed-msf.org</p> <p>Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées Direction générale de la Santé Bureau de la lutte contre le VIH et les MST 8, avenue de Ségur 75350 Paris 07 SP Téléphone : 01 40 56 56 95</p>	<p>Sida info service 0 800 840 800</p>
--	---	---