



Les avis du HCSP
de janvier à
avril 2011

Avis et rapports du Haut Conseil de la santé publique

21 JANVIER 2011

● **Avis sur la stratégie de diagnostic biologique de la dengue**

Depuis plusieurs décennies, la dengue est en progression constante dans les départements français d'Amérique (DFA), et on observe une augmentation du nombre de cas importés en France métropolitaine, en particulier depuis 2004 dans le sud-est du pays.

À la suite de la mise à disposition récente de tests de diagnostic direct de la dengue, la Direction générale de la santé a saisi le HCSP le 20 septembre 2010 afin qu'il élabore une stratégie de diagnostic biologique destinée aux professionnels de santé.

Dans son avis, le HCSP souligne que la place des différents tests biologiques doit s'envisager dans une région géographique donnée en fonction de la situation épidémiologique, de la situation clinique et de la disponibilité des tests. Le HCSP a établi des algorithmes décisionnels dans les différentes localisations géographiques, en fonction des situations cliniques qui sont présentés en annexe.

● **Avis relatif aux recommandations pour la prévention de la transmission en cas de suspicion de grippe**

Après avoir pris l'avis des membres de ses commissions spécialisées Maladies transmissibles et Sécurité des patients, et en association avec la Société française d'hygiène hospitalière, la Société de pathologie infectieuse de langue française et la Société de réanimation de langue française, le Haut Conseil de la santé publique demande que

les recommandations pour la prise en charge de patients suspects de grippe soient rappelées par tous les moyens nécessaires aux professionnels de santé.

11 FÉVRIER 2011

● **Avis relatif à l'actualisation des recommandations vaccinales contre la rougeole pour les adultes**

Une épidémie de rougeole sévit en France depuis trois ans et la circulation du virus s'est particulièrement intensifiée début 2010. Il a été demandé au HCSP, par saisine de la Direction générale de la santé du 4 février 2011, d'étudier les éventuelles adaptations du calendrier vaccinal, notamment quant au rattrapage vaccinal des adultes réceptifs à la maladie.

Le HCSP recommande notamment que toutes les personnes nées depuis 1980 aient reçu au total deux doses de vaccin trivalent afin d'être correctement protégées contre la rougeole.

● **Avis relatif à la poursuite de la campagne de vaccination avec le vaccin MenBvac® en Seine-Maritime, dans la Somme et les départements limitrophes**

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi le 7 décembre 2010 par le directeur général de la santé sur la poursuite de la campagne de vaccination avec le vaccin MenBvac® en Seine-Maritime et dans la Somme en 2011, compte tenu des données épidémiologiques et des doses de vaccin disponibles. Par ailleurs, il est demandé au HCSP d'estimer la population susceptible

d'être vaccinée en 2012 dans ces deux départements.

Le HCSP recommande la poursuite de la campagne de vaccination pour tous les nourrissons, enfants, adolescents et adultes âgés de 2 mois à 24 ans révolus, en incluant les nouvelles cohortes de nourrissons et les nouveaux résidents éligibles.

4 MARS 2011

● **Avis relatif à la stratégie d'utilisation des antiviraux et au dimensionnement des stocks stratégiques nationaux d'antiviraux dans le cadre d'une pandémie grippale**

Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi le 19 avril 2010 par le directeur général de la santé pour ce qui concerne la stratégie d'utilisation des antiviraux et le dimensionnement des stocks stratégiques nationaux d'antiviraux dans le cadre d'une pandémie grippale.

Dans son avis, le HCSP :

- réexamine les stratégies d'utilisation des antiviraux en contexte de pandémie grippale, en envisageant divers scénarios (transmissibilité, pathogénicité, résistance), et différentes modalités d'utilisation et d'acceptation des recommandations de prescription des antiviraux par les médecins ;

- élabore une recommandation argumentée en vue du renouvellement éventuel des stocks nationaux, en précisant notamment la nécessité de disposer de stocks de zanamivir et de formes administrables par voie intraveineuse.

Le Haut Conseil de la santé publique insiste sur la nécessité d'une communication adaptée vers les professionnels de santé

et le grand public, en expliquant les modalités de constitution et d'utilisation du stock.

22 MARS 2011

● **Avis relatif à la surveillance épidémiologique et sanitaire des personnes en provenance du Japon et résidant en France**

À la suite de l'accident nucléaire majeur survenu au Japon, et compte tenu des effets sanitaires potentiellement graves pour la population, le HCSP recommande la mise en place d'un dispositif de recueil d'informations permettant la surveillance épidémiologique et médicale des ressortissants français revenant en France.

Ces informations, portant notamment sur la zone de résidence et de travail et sur les circonstances d'une exposition possible aux rayonnements ionisants issus du site nucléaire de Fukushima, sont de nature à assurer la transparence sur la gestion sanitaire du risque et à rassurer les intéressés

15 AVRIL 2011

● **Avis relatif à la stratégie à adopter concernant la prise en charge des nouveau-nés nourris à partir de dons de lait provenant d'une donneuse Ag HBs positive**

Suite à un dysfonctionnement au lactarium de Marmande à l'origine de la distribution et de la consommation de dons de lait provenant d'une donneuse porteuse chronique du virus de l'hépatite B, le HCSP a été saisi par la direction générale



de la Santé afin de donner un avis sur le risque de transmission du VHB par le lait maternel ; l'intérêt de l'utilisation des immunoglobulines spécifiques anti-hépatite B ; les recommandations de vaccination contre l'hépatite B pour les nouveau-nés et nourrissons concernés par cette contamination potentielle et le message à transmettre aux professionnels de santé et aux parents.

Dans son avis, le HCSP recommande notamment pour tous les nouveau-nés et nourrissons concernés par cette contamination potentielle :

- de ne pas administrer d'immunoglobulines spécifiques anti-hépatite B ;
- de faire pratiquer une recherche de l'antigène HBs dans le plasma ;

- de les vacciner contre l'hépatite B selon le schéma vaccinal recommandé en fonction de leur âge.

12 MAI 2011

● **Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2011**

Ces recommandations ont été élaborées par le Comité des maladies liées aux voyages et des maladies d'importation, et approuvées par le Haut Conseil de la santé publique. Elles tiennent compte notamment du calendrier vaccinal 2011, des données du Centre national de référence du paludisme, du CNR des arboviroses et du Département international de l'Institut de veille

sanitaire ainsi que, pour les vaccins et médicaments, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).

Elles concernent tous les voyageurs, quelles que soient leur destination et les conditions du voyage, et rappellent l'importance, dans la prévention des pathologies liées aux voyages, de la vaccination, des mesures de protection contre les moustiques et autres arthropodes, des mesures d'hygiène alimentaire et de lavage des mains.

Cette année, l'accent est mis notamment sur les recommandations concernant la rougeole et sa réémergence épidémique. Le voyage, n'importe où dans l'ancien monde, est donc l'occasion pour toutes les personnes nées depuis 1980 de recevoir deux doses de vaccin et

pour les enfants d'entreprendre une vaccination précoce.

Ces recommandations sont publiées dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 17 mai 2011, n° 18-19, téléchargeable sur les sites de l'Institut de veille sanitaire et du HCSP

Ces avis et rapports sont consultables sur <http://www.hcsp.fr>

Santé publique

Santé publique. Sommaire 2011/2

Éditorial

- Que vive la démocratie sanitaire !
F. Baudier

Articles

- Enjeux de la consultation pour la première contraception : des jeunes femmes face aux professionnels de santé, *Y. Amsellem-Mainguy*
- Prévalences et facteurs de risque des troubles de la vigilance chez les routiers professionnels au Maroc, *S. Laraqui et al.*

- Étude exploratoire des caractéristiques professionnelles d'un échantillon de suicidants hospitalisés, *S. François et al.*
- Estimation des coûts du programme élargi de vaccination dans le district sanitaire de Grand Bassam, Côte d'Ivoire, *A. Douba, S. N'Cho Dagnan, P. Zengbe-Acray, J. Aka, N. Lépri-Aka*
- Éducation thérapeutique des patients hémophiles : évaluation pédagogique et formative de 10 programmes, *A.M. Ané, L. Wintz, T. Sannié, R. Gagnayre*

Opinions & Débats

- L'éducation thérapeutique du patient : la nécessité d'une approche globale, coordonnée et pérenne, *D. Peljak*
- Opinion de la Fédération nationale de l'éducation et la promotion de la santé sur le rapport « Nouvelles approches

de la prévention en santé publique»,
L. Cambon, C. Ferron

Lectures

Santé publique
BP 7
2, avenue du Doyen-J.-Parisot
54501 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
Téléphone : 03 83 44 87 00